

Euvanol

spray nasal
Adultes/Enfants

COMPOSITION :	
Huile essentielle de géranium déterpénée	0,30 g
Huile essentielle de niaouli purifiée	0,30 g
Camphre synthétique	0,50 g
Bromure de benzalkonium	0,25 g

Excipients : sulfate de sodium décahydraté, stéarate de sorbitane, polysorbate 60, perhydropolysilène, eau purifiée,

Pour 100g de solution.
Flacon de 15 ml de solution nasale pressurisé à l'azote. Pression du flacon : 7,5 à 8 bars.
La valve-doseuse délivre 0,1 ml de solution à chaque pression.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE : PRÉPARATION NASALE POUR USAGE LOCAL (R : Système respiratoire).

MERCK Médication Familiale - 18C, Bd Winston Churchill - 21070 DIJON

Fabricant : SPPH - S, impasse Champeau - 21801 QUETIGNY Cedex

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

EUVANOL SPRAY est indiqué comme traitement local d'appoint en cas de rhume et de rhinopharyngite.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ : • chez l'enfant de moins de 30 mois • chez les enfants ayant des antécédents de convulsions (fébriles ou non) • en cas d'allergie à l'un des constituants, en particulier à la famille des ammoniums quaternaires.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES : EUVANOL SPRAY contient des terpènes qui peuvent entraîner à dose excessive : • des accidents neurologiques à type de convulsions, chez les nourrissons et chez l'enfant • des pauses respiratoires et des collapsus chez le nourrisson. Respecter les doses préconisées et les conseils d'utilisation : veillez à bien administrer ce médicament par pulvérisation (flacon vertical, embout vers le haut) et non en gouttes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : • En cas d'antécédent d'épilepsie, demandez conseil à votre médecin • En cas de fièvre, maux de tête importants, douleur de l'oreille ou autres symptômes associés, consultez votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT : Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant l'allaitement.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE : Voie nasale. Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 30 mois.

Une pulvérisation par narine en tenant le flacon verticalement. L'application peut être renouvelée 4 à 6 fois par jour. Attendre 2 à 3 heures entre chaque pulvérisation.

DURÉE DU TRAITEMENT : Le traitement ne devra pas dépasser quelques jours.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS :

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : • allergie à type d'éternuements, écoulement nasal ou réaction cutanée • en cas de non-respect des doses préconisées : • risque de convulsions chez le nourrisson et l'enfant • possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.
SIGNEZ À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUÉE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION : À conserver à une température inférieure à 25 °C.

RÉCIPIENT SOUS PRESSION : ne pas exposer à une chaleur supérieure à 50 °C, ni au soleil - ne pas percer - ne pas jeter au feu, même vide.

DATE DE DERNIÈRE RÉVISION DE LA NOTICE : Septembre 2005.



En France métropolitaine, MERCK Médication Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. MERCK Médication Familiale vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non.

MERCK Médication Familiale
18C, Bd Winston Churchill – 21070 DIJON

ART. N° ANAMMFD07A