

ANSM - Mis à jour le : 05/08/2024

#### Dénomination du médicament

### STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule Malate de citrulline

#### Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### Que contient cette notice?

- 1. Qu'est-ce que STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule et dans quels cas est-il utilisé
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule ?
- 3. Comment prendre STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule?
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule ?
- 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : A VISEE ANTIASTHENIQUE (A : Appareil digestif et métabolisme)

- code ATC: A13.

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers.

# 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule ?

#### Ne prenez jamais STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule dans le cas suivant :

• si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

#### **Avertissements et précautions**

- En cas de régime hyposodé, tenir compte dans la ration journalière de la présence de 30 mg de sodium par ampoule.
- En raison du pH acide, les ampoules doivent toujours être diluées dans un verre d'eau.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule.

#### **Enfants**

Sans objet.

#### Autres médicaments et STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

## STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule avec des aliments et boissons Sans objet.

#### Grossesse et allaitement

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évité pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

#### STIMOL 1g/10mL contient de l'éthanol et du sodium.

Ce médicament contient 68 mg d'alcool (éthanol) par ampoule, ce qui équivaut à 0.68% p/v. La quantité en éthanol par ampoule de ce médicament équivaut à moins de 2 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

Ce médicament contient 32 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par ampoule. Cela équivaut à 1.6% de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte

## 3. COMMENT PRENDRE STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule?

#### RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

La dose recommandée est de 3 ampoules par jour, en les répartissant au cours de la journée, chez l'adulte.

#### Utilisation chez les enfants

La dose recommandée est de 2 ampoules par jour, en les répartissant au cours de la journée, chez les enfants.

#### Mode et voie d'administration

Voie orale

Diluer les ampoules dans un verre d'eau.

#### Durée du traitement

Ne pas utiliser plus de 4 semaines.

### Si vous avez pris plus de STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule que vous n'auriez dû

Un surdosage éventuel risque d'entraîner une aggravation des effets indésirables (troubles gastro-intestinaux).

Si vous oubliez de prendre STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule Sans objet.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

• Rares : légères brûlures d'estomac en début de traitement.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER STIMOL1g/10 ml, solution buvable en ampoule ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

CE que contient o milor, ma nome, solution buvable en ampoule	eque contient STIMOL, 1g/10mL, solution buvable en ampo	ule 7
---	---	-------

• Pour une ampoule de 10 ml.

- Les autres composants sont :
- Arôme naturel d'orange sangria (contenant notamment de l'alcool, voir rubrique 2), solution d'hydroxyde de sodium à 30 % (m/m), eau purifiée.

### Qu'est-ce que STIMOL, 1g/10ml, solution buvable en ampoule, et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en ampoule de 10 ml. Boîte de 18 ampoules.

#### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

#### **BIOCODEX**

22 RUE DES AQUEDUCS 94250 GENTILLY

#### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

#### **BIOCODEX**

22 RUE DES AQUEDUCS 94250 GENTILLY

#### **Fabricant**

BIOCODEX 1, AVENUE BLAISE PASCAL 60000 BEAUVAIS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

#### La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

Octobre 2020.

#### **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).